患者向医薬品ガイド

2014年4月作成

サビーン点滴静注用 500mg

【この薬は？】

販売名	サビーン点滴静注用 500mg SAVENE injectable 500mg
一般名	デクスラゾキサン Dexrazoxane
含有量 (1バイアル中)	デクスラゾキサン 500mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」http://www.info.pmda.go.jp/ に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

・この薬は、解毒剤と呼ばれるグループに属する注射薬です。
・この薬は、アントラサイクリン系と呼ばれる抗がん剤が血管外に漏れ出たときに起こる、皮膚の腫れ、水ぶくれ、壊死などを抑える薬です。
・次の目的で、医療機関で使用されます。
アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

〇次の人は、この薬を使用することはできません。
・過去にサビーン点滴静注用に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
・妊婦または妊娠している可能性がある人（動物実験で、胎児への影響が認められたとの報告があります。）

〇次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げ

てください。
・腎臓に障害のある人
・肝臓に障害のある人
・高齢の人

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

●使用量および回数

使用量、使用方法は、あなたの年齢、症状、体表面積（身長や体重から計算）などにあわせて医師が決め、医療機関において注射されます。
通常、成人の使用する量、期間および時間は、次のとおりです。

	1回量	最高使用量	使用時間
初日	1000mg/m^2（体表面積）	2000 mg	1～2時間かけて点滴静注します。
2日目			初日と同じ時刻に1～2時間かけて点滴静注します。
3日目	500mg/m^2（体表面積）	1000 mg	

・中等度および高度の腎臓に障害のある人は、通常の半量で使用されます。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

・この薬の使用中や使用後に、骨髄抑制（白血球減少、好中球減少、血小板減少、ヘモグロビン減少など）があらわれることがあるため、定期的に血液検査が行われます。骨髄抑制の症状（「**副作用は？**」の表を参照）があらわれた場合は、医師または薬剤師に相談してください。
・本人あるいはパートナーの方がこの薬を使用している間および使用を中止した後少なくとも3ヵ月間は、妊娠しないよう確実に避妊をしてください。また、この薬を使用している間および使用を中止した後少なくとも3ヵ月間に妊娠がわかった場合は、すぐに医師に相談してください。
・この薬を使用している間は生ワクチン［麻疹（はしか）、風疹（ふうしん）、おたふく風邪、水痘（みずぼうそう）、BCG、ポリオ（小児マヒ）など］の接種はできません。接種の必要がある場合には医師に相談してください。
・授乳を中止してください。
・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。
このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
骨髄抑制 （白血球減少、好中球減少、血小板減少、ヘモグロビン減少） こつずいよくせい （はっけっきゅうげんしょう、こうちゅうきゅうげんしょう、けっしょうばんげんしょう、へもぐろびんげんしょう）	発熱、のどの痛み、鼻血、歯ぐきの出血、あおあざができる、皮下出血、出血が止まりにくい、からだがだるい、めまい、頭が重い感じ、頭痛、耳鳴り、階段や坂を上る時の動悸や息切れ、さじ状爪

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。
これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだがだるい、発熱
頭部	めまい、頭が重い感じ、頭痛
顔面	鼻血
耳	耳鳴り
口や喉	歯ぐきの出血、のどの痛み
胸部	階段や坂を上る時の動悸や息切れ
手・足	さじ状爪
皮膚	あおあざができる、皮下出血
その他	出血が止まりにくい

【この薬の形は？】

販売名	サビーン点滴静注用 500mg
性状	白色～帯黄白色の塊または粉末（凍結乾燥製剤）
形状	バイアル製剤

【この薬に含まれているのは？】

販売名	サビーン点滴静注用 500mg
有効成分	デクスラゾキサン
添加物	塩酸

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：キッセイ薬品工業株式会社（http://www.kissei.co.jp/）
くすり相談センター
電話：０３－３２７９－２３０４
フリーダイヤル：０１２０－８５８－８０１
受付時間：９時～１７時４０分（土、日、祝日を除く）